

臺中榮民總醫院埔里分院

埔里榮民醫院放射線科

子宮輸卵管攝影(HSG)檢查(處置、治療)說明書1

一、檢查方式與範圍：

- (1)在月經過後7天左右來做檢查，檢查前請先排空膀胱內尿液，換上檢查服，檢查時會請你躺在檢查台上，姿勢和婦科門診檢查相同，由婦產科大夫以陰道窺管張開陰道，以子宮探針測子宮方向、大小，再置入注射針管後拔出陰道窺管。
- (2)在X光透視下，婦科醫師會以適當的速率注射對比劑，由放射科醫師為妳照相。
- (3)在檢查過程中妳會感覺到下腹部漲漲的，這是正常現象，不要驚慌；若有其他不適，請立即告訴醫師。
- (4)檢查結束時婦科大夫會放一塊紗布在陰道內，但會露出一端在陰道口外，方便妳當天洗澡時將紗布取出。
- (5)由於檢查時間共兩天，第二天24小時追蹤攝影，一定要回來照相，地點在放射線科，這一項檢查做完才算完成整個子宮輸卵管攝影的檢查。
- (6)此項檢查是將顯影劑注入子宮及輸卵管顯像來評估子宮及輸卵管通暢情形，並診斷子宮及輸卵管有無異常。

二、檢查的禁忌：

懷孕、子宮外孕、骨盆腔發炎、月經剛結束或將來時及對顯影劑過敏者。

三、檢查可能發生的併發症及可能的處理方式：

疼痛、骨盆腔感染、出血、子宮破裂、過敏反應、血管或淋巴管內注入顯影劑造成肺栓塞、骨盆腔沾粘發生腸阻塞、子宮內膜異位、膿性輸卵管破裂等。

如有併發症發生，則會要針對所發生的併發症予以適當的治療；如骨盆腔感染則給予陰道分泌物細菌培養和靜脈注射適當的抗生素。

如有顯影劑注入淋巴管內，而有呼吸不適的現象，則需緊急照胸部X光素片檢查，並留下觀察2到4小時。

四、不實施此檢查的後果及其他可能替代的方式：

此項檢查仍是目前檢查子宮輸卵管是否通暢最重要的方法，至於其他婦科病灶可由超音波掃描、電腦斷層或磁振造影檢查替代。